ÉNUMÉRATION DE PLANTES DE MACÉDOINE,

PAR M. ED. JEANPERT.

Le Service de Botanique du Muséum a reçu de M. le docteur Berton un paquet complémentaire de plantes dont voici la liste :

Renonculacées.

Thalictrum lucidum L. — Forêt d'Hortiak, 800 mètres.

Crucifères.

Lepidium latifolium L. — Plateau d'Hortackoj, 500 mètres.

Caryophyllées.

Silene densiflora Urv. — Kireckoj, 400 mètres.

Acéracées.

Acer monspessulanum L. — Kireckoj, 600 mètres.

Légumineuses.

Melilotus alba Desr. — Langaza, 100 mètres.
Galega officinalis L. — Langaza.
Coronilla emeroides Boiss. et Spr. — Mont du Prophète-Élie, 700 mètres.
Vicia angustifolia L. — Kireckoj, 535 mètres.

Rosacées.

Potentilla argentea L. — Hortiak, 1000 mètres.

Crassulacées.

Sedum caespitosum D. C. — Mont du Prophète-Élie.
S. hispanicum L. var., *eriocarpum* Boiss. — Mont du Prophète-Élie.

Ombellifères.

Sanicula europæa L. — Forêt d'Hortiak, 800 mètres.

Composées.

Centaurea diffusa Lam. — Hortackoj, 500 mètres.
Picnomon Acarna Cass. — Mont du Prophète-Élie, 500 mètres.
Xanthium italicum Moretti. — Lac de Langaza près Ajvaril.

Campanulacées.

Campanula athoa Boiss. et Heldr. — Hortiak, 1.000 mètres.

Primulacées.

Lysimachia punctata L. — Ravin humide, au nord du Mont du Prophète-Élie, 500 mètres.
Cyclamen neapolitanum Ten. — Commun, Kireckoj, Hortiak.

Oléacées.

Fraxinus Ornus L. — Kireckoj, 700 mètres.

Asclépiadées.

Vincetoxicum fuscatum Rchb. — Crête aride du Mont du Prophète-Élie, au-dessus du bois de Kireckoj, dans les rochers, 600-700 mètres.

Scrofulariacées.

Scrofularia Scopoli Hoppe. — Hortiak, 1,000 mètres.
S. nodosa L. — Hortiak, 800 mètres.
Linaria genistifolia Mill. — Route d'Hortackoj à Azrameri, 700 mètres.
L. commutata Bernh. — Mont du Prophète-Élie.
L. Pelisseriana Mill. — Hortiak, 400 mètres.
Digitalis lævigata W. K. — Mont du Prophète-Élie, 600 mètres.
D. lanata Ehrh. — Mont du Prophète-Élie, 600 mètres.

Lentibulariées.

Utricularia vulgaris L. — Ruisseaux au nord du Mont du Prophète-Élie.

Verbénacées.

Vitex Agnus Castus L. — Bords du lac de Langaza près d'Ajvaril.

Labiées.

Calamintha officinalis Mœnch. — Hortiak.
Phlomis Samia L. — Bois de Kireckoj, 650 mètres

Lamium maculatum L. — Aqueduc d'Hortackoj, 500 mètres.

Salvia viridis L. — Crête aride du Mont du Prophète-Élie, 650 mètres.

Teucrium scordioides Schreb. — Langaza, 100 mètres.

Leonurus Cardiaca L. — Hortackoj, 600 mètres.

Stachys tenuifolia Pall. — Rochers schisteux, pente nord du Mont du Prophète-Élie, 600 mètres.

Plombaginées.

Plumbago europaea L. — Horteckoj, 550 mètres.

Illécébracées.

Herniaria incana Lam. — Kireckoj, 400 mètres.

Santalacées.

Thesium divaricatum Jan. — Hortackoj, 500 mètres.

Phytolaccacées.

Phytolacca decandra L. — Largaza.

Orchidées.

Cephalanthera ensifolia Rich. — Hortiak, 400 mètres.

Liliacées.

Asparagus acutifolius L. — Mont du Prophète-Élie.

Gnétacées.

Ephedra campylopoda C. A. M. — Hortiak, 350 mètres.

Cette plante a les rameaux allongés, un peu rudes et pendants. — Le docteur Berton a observé une autre espèce à rameaux dressés, Mont du Prophète-Élie.

Le Jujubier, *Zizyphus sativa* Gaertn., de la famille des **Rhamnacées**, a été observé à proximité des carrières de granit, entre Bounardjik et Philippopoli; en février, les rameaux brillants, rougeâtres, n'offraient plus que les stipules spinescentes; une de ces épines est dressée, droite ou à peine arquée, longue de 2 centimètres; l'autre est crochue, recourbée en bas, longue seulement de 5 millimètres.